



اقدامات قبل و بعد از عمل

این عمل جراحی سرپایی است و نیازی به ناشتا بودن نیست. بعد از این که بیمار در اتاق لیزر پذیرش گردید، ابتدا باید توسط ۳ قطره میدریاتیک مردمک چشم بیمار گشاد شود که بهتر است برای جذب بهتر قطره ها سر بیمار به سمت عقب بوده و چشمها به مدت ۳ - ۲ دقیقه بسته باشد و تا ۳ دقیقه گوشه داخلی چشم با انگشت فشار داده شود که تقریباً حدود ۲۰ دقیقه ای طول می کشد تا مردمک چشم بیمار گشاد گردد.

پس از حضور پزشکتان در بیمارستان به اتاق لیزر خوانده می شوید. پشت دستگاه لیزر می نشینید. قرار گرفتن سر بیمار در وضعیت مناسب بسیار مهم است، یعنی حتماً باید پیشانی چسبیده باشد و چانه در محل مناسب خود، به طرف پائین فشار داده شود.

عمل جراحی سرپایی کپسولوتومی یا لیزر yaG

این عمل جراحی بصورت سرپایی در اتاق لیزر بیمارستان پشت دستگاهی که شبیه به دستگاههای معاینه چشم در مطبهای چشم پزشکی است صورت می گیرد.




علت ایجاد کدورت کپسول عدسی

بعد از انجام عمل کاتاراکت پس از مدت نامعلومی دید بیمار کم می شود. که این به معنی برگشت کاتاراکت نیست. بلکه طی عمل کاتاراکت (کپسول حاوی لنز) ممکن است پس از مدتی کدر شود و بعد از هر عمل کاتاراکت امکان وقوع آن وجود دارد. در این حالت توسط اشعه لیزر قسمت کدر شده کپسول را طی زمان بسیار کوتاهی تمیز می کند.



کپسولوتومی یا لیزر yaG



مرکز پیشگیری و ارتقای سلامت
دپارتمان چشم

شماره تماس: ۳۴۴۹۵۳۳۶ - ۰۴۱

پس از اتمام عمل که حدود ۴ - ۲ دقیقه طول می کشد. ۲ نوع قطره دیگر به چشم بیمار در اتاق لیزر ریخته می شود (قطره بتامتازون و قطره تیمولول) سپس طبق دستور پزشک قطره ها در منزل ادامه می یابد.
و طبق دستور پزشک ۲۴ ساعت تا یک هفته بعد برای کنترل مجدد فشار داخل چشمی و التهاب چشمی به پزشک مراجعه خواهد شد.

آیا دید بیمار همان لحظه بعد از عمل بهتر می شود؟

تا ۲۴ ساعت اول اجسام شناور در جلوی چشم دیده می شود که طی چند هفته بهبود می یابند و اصولاً بعد از ۲۴ ساعت دید شما بهتر خواهد شد. اگر تا ۲۴ ساعت دید شما بهتر نشد مشکل شما از قسمتهای دیگر چشم بوده است و باید به چشم پزشک مراجعه کنید.

آیا روش لیزر yaG یا کپسولوتومی جهت درمان کافی است؟ معمولاً بله

آیا امکان وقوع مجدد این حالت وجود دارد؟

امکان وقوع دید کمتر که ناشی از کدر شدن دوباره کپسول خلفی باشد، وجود ندارد.



سپس پزشک شما نور قرمزی را نشان می دهد که حتماً باید طی این چند دقیقه فقط به آن نگاه کنید و چشم تان را تکان ندهید. زیرا نقطه خاصی را که پزشک برای زدن اشعه لیزر هدف می گیرد با تکان چشم شما خراب شده و اشعه لیزر به جای نامناسب برخورد کرده و نتیجه مطلوب گرفته نمی شود.

