

# دستور مصرف داروی خوراکی برای انجام سی تی اسکن با کنتراست از شکم و لکن

## وسایل مورد نیاز

- آمپول امنی پاک ۲۴۰ و یا ۳۰۰ میلی گرم \* ۵۰ سی سی .... عدد ( تزریقی ) و یا ۱۰۰ سی سی یک عدد
- آمپول مگلو مین ۲۰ سی سی \* ۲ عدد ( جهت مصرف خوراکی )  
( آمپولها توسط پزشک رادیولوژیست در نسخه بیمار نوشته می شود )
- لباس یکبار مصرف یک سری
- برانول سبز
- اکستنشن تیوپ ( توسط بیمار به صورت آزاد از داروخانه تهیه می شود )

# دستور العمل مصرف داروی خوراکی برای انجام سی تی اسکن با کنتراست از شکم و لکن

1. محتوای آمپول های مگلو مین را به مقدار  $2/5$  لیتر آب معدنی ( تقریبا ۱۲ لیوان متوسط ) اضافه کرده و به هم بزنید .
2. ۵ لیوان از مایع تهیه شده را شب قبل از انجام اسکن از ساعت  $10/30$  شب به فاصله هر ۲۰ دقیقه یک لیوان مصرف نمایید.
3. ۴ لیوان از مایع تهیه شده را صبح روز انجام اسکن از ساعت ۷ صبح به فاصله هر ۱۵ دقیقه یک لیوان مصرف نمایید.
4. ساعت ۸ صبح ۳ لیوان از مایع باقی مانده را همراه خود به بخش سی تی اسکن بیاورید.

## قابل توجه بیماران با سابقه حساسیت

اگر سابقه قبلی واکنش به ماده حاجب ، آسم ، سابقه آلرژی قوی دارید ، لطفاً موقع نوبت

گیری یا هنگام مراجعه برای انجام آزمون موارد را به مسئول مربوطه اطلاع دهید؛ ممکن

است رادیولوژیست برای شما آزمون رادیولوژی دیگری را که نیازی به تزریق ماده حاجب

ندارد، پیشنهاد کند و یا قبل از انجام آزمون ، پیشنهاد مصرف دارو از جمله آنتی هیستامین به

شما بدهد.

## نکات آموزشی

• برای آزمون سی تی اسکن شکم و لگن ، باید به مدت ۲-۴ ساعت قبل از آزمون از خوردن غذا و هر چیز دیگر خودداری کنید. همچنین ممکن است مجبور به نوشیدن مقدار زیادی از ماده کنتراست خوراکی شوید ، این مایع برای بهتر نشان دادن برخی از اندام های داخلی بدن است.

• اگر شما به ماده کنتراست ،رنگ و یا هر داروی دیگر حساسیت دارید ، یا باردار هستید ، یا دیابت دارید و داروی متفورمین (گلوکواژ) مصرف می کنید قبل از دریافت ماده حاجب ، به پزشکتان اطلاع دهید ، زیرا ممکن است شما نیاز به اقدامات احتیاطی اضافی داشته باشید.

• اگر شما بیش از ۱۱۰ کیلو گرم وزن دارید ، با پزشک خود تماس بگیرید تخت دستگاه سی تی اسکن دارای محدودیت وزن است. وزن بیش از حد می تواند باعث صدمه به قطعات کار اسکنر شود.

• اگر دارای سابقه بیماری قلبی، آسم، دیابت، بیماری کلیوی و یا مشکلات تیروئید و یا هر بیماری اخیر را به پزشک خود اطلاع دهید زیرا هر یک از این شرایط ممکن است خطر ابتلا به اثر عوارض جانبی غیر معمول را افزایش می دهد.

• قبل از انجام آزمون لازم است یک پیراهن راحتی نخی بپوشید و طلا و جواهر ، عینک ، دندان مصنوعی و گیره سر را بردارید.

• کنتراست می تواند از طریق یک ورید (IV) در دست یا ساعد به شما داده شود.

• اغلب اوقات پزشک برای شما ماده حاجب تزریقی درخواست می کند، این دارو از طریق ورید دست به شما تزریق شده و باعث رویت بهتر اعضای شکمی از جمله سیستم ادراری و کبد و... می شود.

• **دربخش سی تی اسکن:** از شما تقاضا می شود که روی تخت دراز بکشید سپس تصویر برداری مخصوص از شکم و لگن شما به عمل می آید. این آزمون معمولاً ۳۰-۲۰ دقیقه طول می کشد و کاملاً بی درد و ترجیحاً بی خطر است.

• بعد از اتمام آزمون شما می توانید بخش سی تی اسکن را ترک کرده و خوردن و آشامیدن معمولی خود را از سر بگیرید و یا رانندگی کنید.