

دستور العمل مصرف داروی خوراکی برای انجام سی تی اسکن با کنتراست از شکم و لگن

وسایل مورد نیاز

آمپول امنی پاک ۲۴۰ و یا ۳۰۰ میلی گرم * ۵۰ سی سی .. عدد (تزریقی)

آمپول مگلو مین ۲۰ سی سی * ۲ عدد (جهت مصرف خوراکی)

لباس یکبار مصرف * یک سری

برانول سبز

اکستنشن تیوپ

دستور مصرف مگلو مین (خوراکی)

1. محتوای آمپول های مگلو مین را به مقدار ۲/۵ لیتر آب معدنی (تقریبا ۱۲ لیوان متوسط) اضافه کرده و به هم بزنید .
2. ۵ لیوان از مایع تهیه شده را شب قبل از انجام اسکن از ساعت ۱۰/۳۰ شب به فاصله هر ۲۰ دقیقه یک لیوان مصرف نمایید.
3. ۴ لیوان از مایع تهیه شده را صبح روز انجام اسکن از ساعت ۷ صبح به فاصله هر ۱۵ دقیقه یک لیوان مصرف نمایید.
4. ساعت ۸ صبح ۳ لیوان از مایع باقی مانده را همراه خود به یخس سی تی اسکن بیاورید.

قابل توجه بیماران با سابقه حساسیت

• اگر سابقه قبلی واکنش به ماده حاجب ، آسم، سابقه آلرژی قوی دارید ، لطفاً موقع نوبت

گیری و یا هنگام مراجعه برای انجام آزمون موارد را به مسئول مربوطه اطلاع دهید؛ ممکن

است رادیولوژیست برای شما آزمون رادیولوژی دیگری را که نیازی به تزریق ماده حاجب

ندارد، پیشنهاد کند و یا قبل از انجام آزمون پیشنهاد مصرف دارو از جمله آنتی هیستامین به

شما بدهد.

نکات آموزشی

• برای آزمون سی تی اسکن شکم و لگن ، باید به مدت ۲-۴ ساعت قبل از آزمون از

خوردن غذا و هر چیز دیگر خودداری کنید. همچنین ممکن است مجبور به نوشیدن مقدار

زیادی از ماده کنتراست خوراکی شوید این مایع، برای بهتر نشان دادن برخی از اندامهای

داخلی بدن است

• اگر شما به ماده کنتراست، رنگ و یا هر داروی دیگر حساسیت دارید ، یا باردار هستید ، یا

مبتلا به بیماری دیابت هستید و داروی متفورمین (گلوکوفاز) مصرف می کنید قبل از دریافت ماده

حاجب ، به پزشکتان اطلاع دهید ممکن است شما نیاز به اقدامات احتیاطی اضافی داشته باشید.

• اگر شما بیش از ۱۱۰ کیلو گرم وزن دارید ، با پزشک خود تماس بگیرید تخت دستگاه سی تی

اسکن دارای محدودیت وزن است. وزن بیش از حد می تواند باعث صدمه به قطعات کار اسکنر

شود.

• اگر دارای سابقه بیماری قلبی، آسم، دیابت، بیماری کلیوی و یا مشکلات تیروئید و یا هر بیماری

آخر را به پزشک خود اطلاع دهید زیرا هر یک از این شرایط ممکن است خطر ابتلا به اثر

عوارض جانبی غیر معمول را افزایش می دهد.

• قبل از انجام آزمون لازم است یک پیراهن راحتی نخی بپوشید و طلا و جواهر، عینک، دندان

مصنوعی و گیره سر را بردارید.

• کنترل می تواند از طریق یک ورید (IV) در دست یا ساعد به شما تزریق شود.

• اغلب اوقات پزشک برای شما ماده حاجب تزریقی درخواست می کند، این دارو از طریق ورید دست به شما تزریق شده و باعث رویت بهتر اعضای شکمی از جمله سیستم ادراری و کبد و... می شود.

• **دربخش سی تی اسکن:** از شما تقاضا می شود که روی تخت دراز بکشید سپس تصویر برداری مخصوص از شکم و لگن شما به عمل می آید. این آزمون معمولاً ۳۰-۲۰ دقیقه طول می کشد و کاملاً بی درد و ترجیحاً بی خطر است.

• بعد از اتمام آزمون شما می توانید بخش سی تی اسکن را ترک کرده و خوردن و آشامیدن معمولی خود را از سر بگیرید و یا رانندگی کنید.