

دستور العمل انجام سی تی اسکن با کنتراست

وسایل مورد نیاز

- آمپول امنی پاک ۲۴۰/۳۰۰ میلی گرم * ۵۰ سی سی عدد
- لباس یکبار مصرف * یک سری
- برانول سبز
- اکستشن تیوپ

قابل توجه بیماران با سابقه حساسیت

• اگر سابقه قبلی واکنش به ماده حاجب، آسم، سابقه آلرژی قوی دارید ، لطفاً موقع نوبت

گیری و یا هنگام مراجعه برای انجام آزمون موارد را به مسئول مربوطه اطلاع دهید؛ ممکن

است رادیولوژیست برای شما آزمون رادیولوژی دیگری را که نیازی به تزریق ماده حاجب

ندارد، پیشنهاد کند و یا قبل از انجام آزمون پیشنهاد مصرف دارو از جمله آنتی هیستامین به

شما بدهد.

نکات آموزشی

- اگر شما به ماده کنتراست، رنگ و یا هر داروی دیگر حساسیت دارید، یا باردار هستید، یا مبتلا به بیماری دیابت هستید و داروی متفورمین (گلوکوفاز) مصرف می کنید قبل از دریافت ماده حاجب، به پزشکتان اطلاع دهید، زیرا ممکن است شما نیاز به اقدامات احتیاطی اضافی داشته باشید.
- اگر شما بیش از ۱۱۰ کیلو گرم وزن دارید، با پزشک خود تماس بگیرید تخت دستگاه سی تی اسکن دارای محدودیت وزن است. وزن بیش از حد می تواند باعث صدمه به قطعات کار اسکنر شود.

• اگر دارای سابقه بیماری قلبی، آسم، دیابت، بیماری کلیوی و یا مشکلات تیروئید و یا هر بیماری

آخر را به پزشک خود اطلاع دهید زیرا هر یک از این شرایط ممکن است خطر ابتلا به اثر

عوارض جانبی غیر معمول را افزایش می دهد.

• قبل از انجام آزمون لازم است یک پیراهن راحتی نخی بپوشید و طلا و جواهر، عینک، دندان

مصنوعی و گیره سر را بردارید.

• کنترل می تواند از طریق یک ورید (IV) در دست یا ساعد به شما داده شود.

• اغلب اوقات پزشک برای شما ماده حاجب تزریقی درخواست می کند ، این دارو از طریق ورید دست به شما تزریق شده و باعث رویت بهتر اعضای شکمی از جمله سیستم ادراری و کبد و... می شود.

• **دربخش سی تی اسکن:** از شما تقاضا می شود که روی تخت دراز بکشید سپس تصویر برداری مخصوص از شکم و لگن شما به عمل می آید. این آزمون معمولاً ۳۰-۲۰ دقیقه طول می کشد و کاملاً بی درد و ترجیحاً بی خطر است.

• بعد از اتمام آزمون شما می توانید بخش سی تی اسکن را ترک کرده و خوردن و آشامیدن معمولی خود را از سر بگیرید و یا رانندگی کنید.