

## دستور آمادگی برای کرافی ( نوبت صبح )

قرص دایمتیکون ۶ عدد بعد از شام هر نیم ساعت یک قرص جویده شود .

قرص بیزاکودیل ۴ عدد از ساعت ۴ عصر روز قبل از امتحان هر یک ساعت یک قرص مصرف شود .

روغن کرچک یا شربت سنا گراف بعد از شام میل نمایند.

بیمار روز قبل امتحان شام سبک و بدون چربی میل نموده و از مصرف حبوبات و لبنیات پرهیز نمایند.

صبح روز امتحان ساعت.... به صورت ناشتا مراجعه نمایند.

# نکات آموزشی

## آمادگی بیمار جهت انجام برخی رادیوگرافی ها

دنیای امروز شاهد پیشرفت های چشمگیری در علوم پیراپزشکی در تکنولوژی رادیولوژی است. کاربرد این علوم در کشور ما نیز به منظور تشخیص و درمان بیماری ها روز به روز اهمیت بیشتری می یابد از این رو به متخصصان مجرب و نیز به پرستاران آگاه برای کمک به بیماران برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف نیازمندیم .

## آمادگی بیمار در (KUB و کمری)

در عکسبرداری kUB و کمری بیمار باید آمادگی قبلی داشته باشد یعنی در شب قبل از رادیوگرافی با تجویز مسهل های روغنی و داروهای جذب کننده گاز روده و یا داروهای کمکی به منظور به حرکت در انداختن حالات طبیعی روده در صورت وجود یبوست در بعضی افراد و تخلیه مثانه از ادرار، سعی شود تا موانع تصویری که کلیه ها و دستگاه صفراوی و غیره را می پوشاند از سر راه برداشته شوند ، اهمیت این موضوع در مواردی که منظور عکسبرداری سنگ ریزه های ادراری و یا حدود و اندازه اعضای داخل شکمی است بیشتر نمایان می گردد .

• **دستورات آمادگی بر حسب وزن - سن - جنسیت و چگونگی حال عمومی و وضع بیماری**

**تغییر می کند.**

• **پرتونگاری از شکم در مواردی مانند آپاندیسیت - کولیک نفروتیک - تصادف - بلع**

**اجسام خارجی - انواژیناسیون - پیچ خوردگی روده و غیره که عکسبرداری جنبه فوری**

**دارد زمان بسیار مهم است تصویر برداری بدون هیچ آمادگی قبلی انجام می شود.**

# اروگرافی یا ( IVP (Intra venous Pyelography

- **اروگرافی نامی است که به آزمایشات و تحقیقات دستگاه ادراری بعد از تزریق ماده حاجب اطلاق می شود. در این طریق برای نشان دادن طرز کار لگنچه ها و حالب ها از اروگرافین ۶۰٪ یا ۷۶٪ استفاده می شود که از طریق داخل وریدی به بیمار تزریق می شود بیمار باید شام ساده ای میل نماید و از داروهای ملین شب قبل از گرافی که معمولاً روغن کرچک است مصرف نماید تا روده ها از مدفوع خالی شود و شکم بیمار تمیز گردد. روز گرافی بیمار باید ناشتا باشد .**

## پرتونگاری معده ( U.G.I )

- بیمار پس از نیمه شب چیزی نخورد و باید کاملاً ناشتا باشد مدت زمان خالی بودن معده از غذا و مایعات حداقل ۸ تا ۱۰ ساعت است . بیمار حتی از کشیدن سیگار و جویدن آدامس خودداری کند در غیر اینصورت ترشح غدد بزاقی معده باعث بوجود آمدن مایع در معده شده در نتیجه باعث می شود که تخلیه معده دچار تأخیر شود .