

دستور آمادگی برای کرافی شکم (کلیه ها - کمر و...) (نوبت بعد از ظهر)

- قرص دایمتیکون ۸ عدد ، دو عدد شب قبل امتحان ساعت ده شب جویده شود و ۶ عدد باقیمانده ساعت صبح هر یک ساعت ۲ عدد جویده شود .
- قرص ییزاکودیل ۵ عدد * (۳ عدد عصر روز قبل از امتحان از ساعت ۶ عصر هر یک ساعت یک عدد خورده شود - دو عدد باقی مانده صبح روز قبل از امتحان از ساعت ۸ صبح هر نیم ساعت یک عدد خورده شود .)
- بیمار شب قبل از امتحان شام سبک خورده و صبح روز امتحان صبحانه فقط نان و چای میل کند و از خوردن لبنیات پرهیزد.
- بیمار روز مراجعه نهار میل نکرده و در ساعت ... به بخش رادیولوژی مراجعه کند .

نکات آموزشی

آمادگی بیمار جهت انجام برخی رادیوگرافی ها

دنای امروز شاهد پیشرفت های چشمگیری در علوم پیراپزشکی در تکنولوژی رادیولوژی است. کاربرد این علوم در کشور ما نیز به منظور تشخیص و درمان بیماری ها روز به روز اهمیت بیشتری می یابد از این رو به متخصصان مجرب و نیز به پرستاران آگاه برای کمک به بیماران برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف نیازمندیم .

آمادگی بیمار در (KUB و کمری)

در عکسبرداری kuB و کمری بیمار باید آمادگی قبلی داشته باشد یعنی در شب قبل از رادیوگرافی با تجویز مسهل های روغنی و داروهای جذب کننده گاز روده و یا داروهای کمکی به منظور به حرکت در انداختن حالات طبیعی روده در صورت وجود یبوست در بعضی افراد و تخلیه مثانه از ادرار، سعی شود تا موانع تصویری که کلیه ها و دستگاه صفراوی و غیره را می پوشاند از سر راه برداشته شوند. اهمیت این موضوع در مواردی که منظور عکسبرداری سنگ ریزه های ادراری و یا حدود و اندازه اعضای داخل شکمی است بیشتر نمایان می گردد .

• **دستورات آمادگی بر حسب وزن - سن - جنسیت و چگونگی حال عمومی و وضع بیماری**

تغییر می کند.

• **پرتونگاری از شکم در مواردی مانند آپاندیسیت - کولیک نفروتیک - تصادف - بلع**

اجسام خارجی - انواژیناسیون - پیچ خوردگی روده و غیره که آزمایش جنبه فوری

دارد زمان بسیار مهم است آزمایش بدون هیچ آمادگی قبلی انجام می شود.

اروگرافی یا (IVP (Intra venous Pyelography

- **اروگرافی نامی است که به آزمایشات و تحقیقات دستگاه ادراری بعد از تزریق ماده حاجب اطلاق می شود. در این طریق برای نشان دادن طرز کار لگنچه ها و حالب ها از اروگرافین ۶۰٪ یا ۷۶٪ استفاده می شود که از طریق داخل وریدی به بیمار تزریق می شود بیمار باید شام ساده ای میل نماید و از داروهای ملین شب قبل از گرافی که معمولاً روغن کرچک است مصرف نماید تا روده ها از مدفوع خالی شود و شکم بیمار تمیز گردد. روز گرافی بیمار باید ناشتا باشد .**

پرتونگاری معده (U.G.I)

- بیمار پس از نیمه شب چیزی نخورد و باید کاملاً ناشتا باشد مدت زمان خالی بودن معده از غذا و مایعات حداقل ۸ تا ۱۰ ساعت است . بیمار حتی از کشیدن سیگار و جویدن آدامس خودداری کند در غیر اینصورت ترشح غدد بزاقی معده باعث بوجود آمدن مایع در معده شده در نتیجه باعث می شود که تخلیه معده دچار تأخیر شود .