

رادیوگرافی IVP

- ۱- شام سوپ صاف شده میل کنید.
- ۲- ساعت ۹ شب قبل از آزمون یک شیشه روغن گرچک یا شربت سناگراف میل نمایید.
- ۳- دو عدد قرص بیزاکودیل ساعت ۷ شب میل نمایید.
- ۴- ۱۰ عدد قرص دایمتیکون از ساعت ۷ صبح روز آزمون هر یک ربع ساعت یک عدد بدون آب بجوید.
- ۵- روز آزمون ناشتا بمانید.
- ۶- در صورت انجام هرگونه عمل جراحی ، سوابق حساسیت و مصرف داروی خاص به مسئول پذیرش اطلاع دهید.
- ۷- لباس راحت بدون دگمه و زیپ ، همراه داشته باشید.
- ۸- از استعمال دخانیات و مصرف نوشابه خودداری کنید.
- ۹- سایر وسایل دارویی خود را طبق نسخه تهیه نموده و همراه داشته باشید. (آمپول امنی پاک ۱۰۰ سی سی + سرنگ ۵۰ سی سی ۲ عدد + برانول)

نکات آموزشی

آمادگی بیمار جهت انجام برخی رادیوگرافی ها

دنایای امروز شاهد پیشرفت های چشمگیری در علوم پیراپزشکی در تکنولوژی رادیولوژی است. کاربرد این علوم در کشور ما نیز به منظور تشخیص و درمان بیماری ها روز به روز اهمیت بیشتری می یابد از این رو به متخصصان مجرب و نیز به پرستاران آگاه برای کمک به بیماران برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف نیازمندیم.

اروگرافی یا (IVP (Intra venous Pyelography

اروگرافی نامی است که به آزمایشات و تحقیقات دستگاه ادراری بعد از تزریق ماده حاجب اطلاق می شود. در این طریق برای نشان دادن طرز کار لگنچه ها و حالب ها از اروگرافین ۶۰٪ یا ۷۶٪ استفاده می شود که از طریق داخل وریدی به بیمار تزریق می شود بیمار باید شام ساده ای میل نماید و از داروهای ملین شب قبل از گرافی که معمولاً روغن کرچک است مصرف نماید تا روده ها از مدفوع خالی شود و شکم بیمار تمیز گردد. روز گرافی بیمار باید ناشتا باشد.