

آمادگی لازم جهت انجام آزمون رادیوگرافی باریوم انما

1. شام سوپ صاف شده میل کنید .
2. ساعت ۹ شب قبل از آزمون یک شیشه روغن گرچک میل نمائید .
3. دو عدد قرص ییزا کودیل ساعت ۱۱ شب میل کنید .
4. ۶ عدد قرص دایمتیکون از شب قبل ۴ عدد هر نیم ساعت یک عدد و صبح روز مراجعه ۲ عدد جویده شود .
5. یک عدد شیاف ییزا کودیل را ساعت ۷ صبح روز آزمون استعمال نمائید .
6. از استعمال دخانیات و مصرف نوشابه های گاز دار خودداری کنید .
7. روز انجام آزمون ناشتا بمانید .

8. در صورت انجام هرگونه عمل جراحی ، سوابق حساسیت و مصرف داروی خاص به

مسئول پذیرش اطلاع دهید

9.لباس راحت بدون دگمه و زیپ ، همراه داشته باشید .

10.سه بسته پودر سولفات باریوم – یک عدد رکتال تیوپ سایزو یک جفت دستکش

لاتکس سایز ۸ و یک عدد دروشت و لوله ساکشن و پنبه از داروخانه تهیه و همراه خود

داشته باشید .

نکات آموزشی پرستاری سیستم کوارشی

بیمار از شب قبل چیزی نخورد و باید کاملاً ناشتا باشد مدت زمان خالی بودن معده از غذا و

مایعات حداقل ۱۰ تا ۱۲ ساعت است .

بیمار حتی از کشیدن سیگار و جویدن آدامس خودداری کند .