

رادیوگرافی شکم و کمر

- ۱- شام سوپ صاف شده میل کنید.
- ۲- دو عدد قرص بیزاکودیل ساعت ۱۱ شب میل نمایید.
- ۳- قرص دایمتیکون ۶ عدد شب قبل ۴ عدد هر نیم ساعت و صبح روز مراجعه ۲ عدد جویده شود.
- ۴- روز انجام آزمون ناشتا بمانید.
- ۵- در صورت انجام هرگونه عمل جراحی ، سوابق حساسیت و مصرف داروی خاص به مسئول پذیرش اطلاع دهید .
- ۶- لباس راحت بدون دگمه و زیپ ، همراه داشته باشید.
- ۷- از استعمال دخانیات و مصرف نوشابه از یک روز قبل از رادیوگرافی خودداری کنید .

نکات آموزشی

دنای امروز شاهد پیشرفت های چشمگیری در علوم پیراپزشکی در تکنولوژی رادیولوژی است. کاربرد این علوم در کشور ما نیز به منظور تشخیص و درمان بیماری ها روز به روز اهمیت بیشتری می یابد از این رو به متخصصان مجرب و نیز به پرستاران آگاه برای کمک به بیماران ، برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف نیازمندیم .

در عکسبرداری kuB و کمری بیمار باید آمادگی قبلی داشته باشد یعنی در شب قبل از رادیوگرافی با تجویز مسهل های روغنی و داروهای جذب کننده گاز روده و یا داروهای کمکی به منظور به حرکت انداختن حالات طبیعی روده در صورت وجود یبوست در بعضی افراد و تخلیه مثانه از ادرار،

سعی شود تا موانع تصویری که کلیه ها و دستگاه صفراوی و غیره را می پوشاند از سر راه برداشته شوند اهمیت این موضوع در مواردی که منظور عکسبرداری سنگ ریزه های ادراری و یا حدود و اندازه اعضای داخل شکمی است بیشتر نمایان می شود .

دستورات آمادگی بر حسب وزن - سن - جنسیت و چگونگی حال عمومی و وضع بیماری تغییر می کند.. پرتونگاری از شکم در مواردی مانند آپاندیسیت - کولیک نفروتیک - تصادف - بلع اجسام خارجی - انواژیناسیون - پیچ خوردگی روده و غیره که آزمایش جنبه فوری دارد زمان بسیار مهم است آزمایش بدون هیچ آمادگی قبلی انجام می شود.